

دکتر سید علی اصغر فخر موسوی

متخصص کلیه و مجازی ادراری

دیالیز برای بدن چه کارمند، به عبارتی

چه کسانی تحقیق دیالیز را می‌گیرند؟

بیماران که دلایل مختلف از جمله دیابت

فسخارخون و ... به تاریخی کلیوی مبتلا

می‌شوند که همچو کاریکاری دارد بدغصه و

زاید جمع شده نیستند، باید برای حفظ حیات،

تحت دیالیز قرار گیرند.

آیا توجه به رژیم غذایی برای من که

اگر بیماری که دیالیز زنم

ذغالی مناسایی داشته باشد، سلامتی اش

به خطرو افزایش و افزایش فی بیمار باعیت زیم

ذغالی مناسب به سطح مناسبی از سلامت

خواهد رسید.

رژیم غذایی بیمار باید حاوی مقادیر مناسب

کالری و پروتئین باشد تا تواند اختیارات

بیمار را برآورده کند بیماران که تحبت

دیالیز قرار می‌گیرند، قبل از شروع دیالیز

محبودیت مصرف پروتئین روزانه ۲۰۰

آنها وجود دارد اما می‌باشد، شروع دیالیز، به

علت این که سومون ناشی از تجویز پروتئین

توسط دستگاه دیالیز تا حدی برداشته می‌شود

مقدار مصرف پروتئین بیماران باید نسبت

به قابل ارزیابی پوشیده باشد چراکه پروتئین

درین موجب افزایش و ترمیم بافت

های آسیب دیده می‌شود در صورت مصرف

نکرد مقادیر کافی پروتئین، قدرت دفاعی

بدن در مقابل بیماری ها کاهش می‌یابد.

بانوان

ارتباط میزان درد زایمان و افسردگی

نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد،

افسردگی پس از زایمان به میزان درد مادرپس

از تولد فرزند نموده می‌شود.

نتایج تحقیقات جدید ازهار شده در نشست

سرکه باز ایامک، ادویه ایتالیایی، نمک و فلفل را داخل یک کاسه

باهم مخلوط کنید. سینه مرغ را داخل یک کیسه بربیزید و مایع تهیه

شده را به آن اضافه کنید و حدائقی یک ساعت داخل بیچال بگذارید.

نکته: برای روغن زنایتا ۱۲ ساعت، برای موهار شدن زمان بمهیه.

بعد از این که آن را کیسه خارج کرید، بگذارید و روی آن بگذارد و یک آبکش

روغن شود و با استعمال کمی مرغ هارا خشک کنید. فریا گریل را

روی سرمه در سرمه باز نهاده و سرمه بازه را از هر ۱۰

زن، پس از زایمان دچار افسردگی می‌شود و

برخی افراد افسردگی خارج روزه می‌کند.

محقق ارشد این مطالعه از زایمان بیشتر

باشد، زنان دچار افسردگی شدیدتری می‌

شوند.

آمارهای احکام از آن است: حدویزک زن از هر ۱۰

زن، پس از زایمان دچار افسردگی می‌شود و

برخی افراد افسردگی خارج روزه می‌کند.

محقق ارشد این مطالعه از داشنگاه هارورد

می‌گوید: «افسرگی پس از زایمان ممکن است

یک تادوام پس از زایمان روز کند».

به گفته کارشناسان بهداشتی، بی خوابی

شديد، بی ثباتی خلقو اساسن خستگی از

علمی افسردگی پس از زایمان است.

درمان انحراف انگشت شست و صافی کف پا

پزشکی

دروغی پا و در مرکز انحراف شست سبب تأثیر می‌گذارد و همچنین می‌تواند بر خارج از اینگشت شست نیز تأثیر گذارد باشد. این عارضه، در زنان و مردان رخ می‌دهد اما پرداخت آن در زنان بیشتر است.

بوونیون گاهی بعلامی همراه و گاه بدون علام است. هالوس و الگوس یک تغییر شکل ممکن است دیده شود و در چشم کوتاه راه های درمان این می‌تواند شامل استراحت سرمه، تغیر کف، استفاده از یخینیان (ارتوپتیک)، چراخی قابل درمان است، همچنین افراد باشد، مدد نظر قرار دهند. گزارش ایران اکنونمی، صافی کف پا زدیگ سه میعادن شود،

شود، از وقته است. محمد رضا میعادن پا اطباقی، در راه شایع ترین بیماری های پا اطباقی، در تاریخ اینگشت شست است، یکی از اینها که دارای ۱۰ تا ۱۵ سالگی باشد،

کف پا که معمولاً در سمت داخلی آن دیده می‌شود، پا اطباقی که در آن سو قدم است،

پا اطباقی که در این سو قدم است،

پا اطباقی که